

Definición operacional de intoxicación con benzodiazepinas

Son medicamentos de amplio uso con propiedades ansiolíticas, hipnóticas y sedantes, con potencia, acción y metabolitos variables.

En general el nivel de toxicidad para las benzodiazepinas es muy alto.

Se mencionan algunas en la siguiente tabla.

Benzodiazepina

Nombre	Dosis tóxica
Triazolam	5 mg
Flunitrazepam	20 mg
Nitrazepam	50 mg
Lorazepam	100 mg
Diazepam	500 mg
Cloracepato	500 mg

Manifestaciones clínicas

Condiciona un Toxíndrome hipnosedante (ansiolítico, miorelajante, hipnótico, anticonvulsivante).

Los síntomas del SNC se pueden iniciar a los 30-120 minutos de la ingestadependiendo del compuesto.

Los síntomas más comunes suelen ser sedación, ataxia, somnolencia, disartria, miosis, relajación muscular.

Dependiendo de la sobredosis puede evolucionar a alteraciones cardiopulmonares, coma y muerte.

Diagnóstico.

- La Historia Clínica detallada
- Historia de ingestión o inyección
- reciente. Manifestaciones clínicas

Tratamiento

- Medias generales
- Antídoto específico flumazenil, que es un antagonista del receptor de los benzodiazepinas